



EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL CONSUMO DE ANTIDEPRESIVOS EN ESPAÑA

Sofía Sáez de Montagut López-Sáez, Joaquín Ramírez Márquez

Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.

Plaza de Ramón y Cajal s/n, 28040 Madrid

INTRODUCCIÓN

La depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por una pérdida del ánimo, apatía, falta de interés por las actividades cotidianas, fatiga, insomnio... Estos síntomas, en mayor o menor grado, pueden formar parte de los cambios de humor propios de cualquier individuo, sin embargo hablamos de enfermedad mental cuando se mantienen presentes de forma constante.

Alta prevalencia. 10,5% en España

Enfermedad mental más común

Consumo de recursos sanitarios y pérdida de productividad

OBJETIVO

El objetivo fijado para la realización de esta revisión bibliográfica ha sido analizar cronológicamente la evolución del consumo de medicamentos antidepresivos en España y su situación actual.

ETIOLOGÍA

Factores genéticos

Factores neuroquímicos

DA

5-HT

NA

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis del consumo de los diferentes tipos de antidepresivos comercializados en España entre los años 2000-2013:

METODOLOGÍA

Revisión bibliográfica llevada a cabo utilizando bases de datos: PubMed y NCIB ; libros de texto ; organismos oficiales; revistas y publicaciones científicas...


CONCLUSIONES

Se ha observado un aumento importante en el consumo de estos fármacos, debido a:

- Aumento en el número de trastornos del estado de ánimo.
- Mayor y mejor detección de estos trastornos depresivos.
- Disminución del estigma social asociado a esta enfermedad.
- Extensión en las indicaciones terapéuticas de este tipo de fármacos.


BIBLIOGRAFÍA

- Antidepresivos, Revisión – Juana Benedí, Carmen Romero - Farmacia Profesional Vol. 19, Núm. 10, Noviembre 2005.
- FLÓREZ, Jesús. Farmacología Humana; Juan Antonio Armijo, África Mediavilla, (Directores asociados). 6ª edición, Barcelona, España: Elsevier España, 2014. ISBN: 978-84-458-2316-3.
- Psicofarmacología de la depresión. Antonio J. Sánchez. Psiquiatra USM Pere Bonfill de Valencia. CM de Psicobiología, 2013; 2: 37 - 51.
- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios Enero 2015. Utilización de medicamentos antidepresivos en España durante el periodo 2000-2013. INFORME DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS U/AD/V1/14012015
- MEDIMECUM Guía de terapia farmacológica 2015 – Springer Healthcare




Consumo total:


- Año 2000 - 26,5 DHD
- Año 2013 - 79,5 DHD




ISRS: 20,4 DHD - 52,9 DHD
Escitalopram, el que más ha crecido: 1,3 DHD - 15,3 DHD



OTROS: 2,7 DHD - 23,6 DHD
Venlafaxina, el que más ha crecido: 1,1 DHD - 8,6 DHD



ADT: 3,4 DHD - 2,9 DHD
Amitriptilina, el más consumido, utilizado también para otras patologías



IMAO: *Moclobemida* *Tranilcipromina*
Uso anecdótico en comparación con otros grupos, utilizados en depresiones resistentes.